

Возможные осложнения во время беременности:



I Триместр (1-13 недель)

Ранний токсикоз - легкая степень-рвота 5 и менее раз, средняя степень тяжести -10 раз, тяжелая степень - до 20-25раз в день.

Действие: обратится в ЖК. Госпитализация в средней и тяжелой форме.

Угроза (прерывание беременности) - боли внизу живота, пояснице, кровянистые выделения.

Действия: вызов скорой медицинской помощи.

ОРВИ - насморк, боль в горле и кашель – обусловлены

воспалительными процессами в верхних и нижних дыхательных путях.

Действия: вызвать врача терапевта на дом,

уведомить врача гинеколога.

II Триместр (14-29 недель)

Опасные состояния:

Анемия — это патологическое состояние, при котором уровень гемоглобина и/или эритроцитов ниже нормы. Это приводит к тому, что ткани и органы получают недостаточно кислорода. В результате замедляются или нарушаются внутриклеточные обменные процессы.

Признаки: утомляемость, изменение вкуса, артериальное давление, головокружение, обмороки.

Действия: обратиться в ЖК для обследования.

Угроза прерывания беременности - боли внизу живота, пояснице, кровянистые выделения.

Действия: вызов скорой медицинской помощи.

Предлежание плаценты - это аномальное прикрепление органа, когда плацента локализуется в нижней части матки и частично или полностью закрывает внутренний маточный зев.

Признаки: кровянистые выделения из половых путей различной интенсивности

Действия: вызвать бригаду скорой помощи

III Триместр (29 недель и до родов)

Осложнения:

Гестоз - это осложнение нормальной беременности, которое может развиваться после 20 недель гестации. Основными признаками являются подъем давления в артериях, появление белковых молекул в моче и отечность. В настоящее время термин «гестоз» заменен на преэклампсию, что в очередной раз подчеркивает серьезность и опасность этого патологического состояния.

При гестозе проводится лечение в условиях стационара !!!

Хроническая фетоплацентарная недостаточность - это нарушение, обусловленное структурными и функциональными изменениями в плаценте, наступившими в результате различных патологических изменений в организме матери или плода, что повлекло за собой расстройство транспортной, питательной, гормональной и метаболической функций плаценты.

Признаки: Ярких признаков может не быть,

диагноз подтверждается – УЗИ, доплерометрией, КТГ.

Преждевременная отслойка плаценты— это патологическое состояние, при котором происходит раннее отделение плаценты от матки (во время беременности, в первом и во втором периоде родов), которое в норме должно происходить только после родов. Это осложнение беременности, которое

представляет риск для вынашивания плода. Она может также быть причиной значительной кровопотери и поэтому является жизнеугрожающим состоянием для самой беременной.

Это опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи.